

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ОЦИЛОКОКЦІНУМ®**  
**(OSCILLOCOCCINUM®)**

**Склад:**

*діюча речовина:*

1 г гранул містить *Anas barbariae, hepatis et cordis extractum* 200К – 0,01 мл;

*допоміжні речовини:* сахароза, лактози моногідрат.

**Лікарська форма.** Гранули дозовані.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білі або практично білі округлі гранули, легко розчиняються у воді.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.* Фармакологічні властивості лікарського засобу зумовлені дією його компонентів. Засіб регулює захисні реакції організму.

*Фармакокінетика.* Не вивчалась.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.** Симптоматичне лікування та профілактика грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій, що проявляються пропасницею, ознобом, ломотою в тілі та головним болем.

**Протипоказання.**

- Підвищена чутливість до діючих або допоміжних речовин препарату.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості фруктози, глюкозо-галактозна мальабсорбція або сахарозо-ізомальтазна недостатність.
- Рідкісна спадкова форма непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або глюкозо-галактозна мальабсорбція.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Не виявлено.

**Особливості застосування.**

Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати Оцилококцінум®. Цей лікарський засіб не замінює сезонної вакцинації проти грипу.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Оскільки безпека застосування Оцилококцінуму® у період вагітності або годування груддю не досліджувалась, препарат у цей період можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода/дитини.


*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не виявлено.

**Спосіб застосування та дози.**


Для перорального застосування.

*Дорослі та діти*

Прийняти 1 дозу якомога раніше після появи перших симптомів захворювання. Повторити 2 рази з інтервалом у 6 годин. Приймати протягом 1–3 днів.



Пенал із гранулами витягнути із упаковки



Відкрити пенал, відкрутивши кришечку



Вміст пенала перемістити під язик, тримати у роті до повного розчинення

*Діти.* У разі застосування дітям віком від 2 до 6 років гранули рекомендується розчинити у невеликій кількості води.

*Діти.* Оцилококцінум® можна застосовувати дітям віком від 2 років.

**Передозування.** Про випадки передозування лікарського засобу не повідомлялося.

**Побічні реакції.** В осіб з гіперчутливістю до компонентів препарату можливі прояви алергічних реакцій, включаючи шкірні висипи, свербіж.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці та поза полем зору дітей.

Зберігати в оригінальній упаковці. Не потребує особливих умов зберігання.

**Упаковка.** Гранули дозовані по 1 г у поліпропіленовому пеналі з поліетиленовою кришечкою. По 6 пеналів у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** БУАРОН/BOIRON

**Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

Авеню де л'Уест Ліоне, 2 - Мессімі 69510, Франція  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy, France

**Заявник.** БУАРОН/BOIRON

**Місцезнаходження заявника.**

Авеню де л'Уест Ліоне, 2 - МЕССІМІ 69510, Франція  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY, France

**Дата останнього перегляду.**